

# ワクチン NEWS No.8

令和3年12月24日時点の情報をもとに作成しています。



## 3回目接種のワクチンについて



**ファイザー社、武田/モデルナ社のワクチンが使用でき、  
1・2回目と異なるワクチン接種も可能になりました**

**接種の対象：2回目のワクチン接種を完了した18歳以上の方**

### 3回目接種に使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを接種できます。

ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。



### 3回目接種の安全性と効果

#### 安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

#### 効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。



出典：追加(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ(65歳以上の方へ)(令和3年12月17日厚生労働省発行)

### 3回目接種のワクチンと接種場所

- ファイザー社：市内医療機関(市内約1,900か所)
- 武田/モデルナ社：集団接種会場(11か所設置予定)

**\*接種場所によって受けられるワクチンの種類が異なります。**

3回目の接種券は2月以降順次発送します。

\*高齢者の方の接種間隔の前倒しについては、現在検討しており、決定次第お知らせします。

## 1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われました。



### 安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されることが報告されています。

### 効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田 / モデルナ社ワクチン(\*)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇することが報告されています。

(\*)武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50 $\mu$ g接種することになっているが、本研究では100 $\mu$ g接種した結果が報告されている。

出典:追加(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ(65歳以上の方へ)(令和3年12月17日厚生労働省発行)



## 1・2回目の接種を希望される方へ

1・2回目の接種も医療機関等で受け付けています。

詳細は、市ウェブサイト、ワクチン接種コールセンターまたは各区役所の相談員にご相談ください。



## 感染防止対策についても引き続きご協力をお願いします

①マスクを着用 ②人と人の距離を確保 ③3密を避ける、大声を出さない

- 3回目接種に関する計画は、国の方針等に基づいたものです。今後国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直していきます。
- 今回お知らせした内容は、本市の需要に見合ったワクチン供給を受けることを前提とした計画です。ワクチン供給の状況により、変更となる可能性があります。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせは、

**横浜市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター** まで

**☎ 0120-045-070** **FAX 050-3588-7191**  
(耳の不自由な方のお問合せ用FAXです)

**受付時間** 毎日9時～19時 (電話のおかけ間違いにご注意をお願いします)

**対応言語** English、中文、한국어、Tiếng Việt、नेपाली、Português、Español、日本語

最新情報は  
こちら

横浜市ウェブサイト  
新型コロナウイルスワクチン接種について  
(特設ページ) [横浜市 ワクチン接種](#)



横浜市LINE  
公式アカウント



Twitter  
横浜市広報課

